


Es un fertilizante foliar, a base de Fosfito de Zinc, presenta beneficios como

- 1.- Corrector de deficiencias de Zinc, formulado como CoFactor enzimático de la síntesis de auxinas y proteínas.
- 2.- Promueve la producción de fitoalexinas, responsables de la defensa natural de las plantas.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso común. Nunca mezcle con nitrato calcio.

COMPOSICIÓN



- Zinc, como ion Zn, proveniente de fosfito de Zinc
- Fosforo proveniente del Fosfito de Zinc
- Diluyentes y acondicionadores

DOSIS Y MODO DE APLICACIÓN

| Cultivo | Dosis | Etapa |
|---|--|---|
| Tomate, tomatillo, chiles, berenjenas | 2 a 3 L/HA. Fertirrigación 1 a 2 L/HA.Foliar | A partir de los 15 días |
| papas | 2 a 3 L/HA. Fertirrigación 1 a 2 L/HA. Foliar | A partir de los 15 días |
| Calabaza, melones, sandías, pepino. | 2 a 3 L/HA. Fertirrigación 1 a 2 L/HA.Foliar | A partir de los 15 días |
| Maíz, maíz dulce, trigo, sorgo, avena, cebada | 1 a 2 L/HA. Foliar | Al cierre del cultivo |
| Frijol, fíjil ejotero, chicharo garbanzo | 1 a 2 L/HA. Foliar | Al aparecer las primeras flores |
| Frutales | 1 a 2 L/HA. | En primer riego y después de la cosecha |
| Algodón | 1 a 2 L/HA. Foliar | Al cuadro |