

BOROFIX® FICHA TÉCNICA

Corrector de deficiencia.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	PORCENTAJE EN PESO
Boro	8.34%
óxido de Potasio (K ₂ O)	4.72%
Extracto de Algas Marinas	6.50%
Aminoácidos Libres	2.50%
Polisacáridos	2.00%
Molibdeno	0.03%
Zinc	1.6%
Diluyentes y Acondicionadores	75.91%
Total	100.00%

INFORMACIÓN GENERAL:

Es un corrector de deficiencia a base de Boro, Molibdeno, Potasio, algas, y polisacáridos, presenta beneficios como:

- Mejorar la polinización y cuajado de fruto.
- Aumentar el transporte energético dentro de la planta hacia el fruto.
- Incrementa la calidad del fruto.

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LA FORMA AQUÍ RECOMENDADA

CULTIVO	DOSIS	ETAPA
Tomate, Tomatillo, Chiles Berenjenas, Vid, Espárragos	2 a 3 lt/ha. Fertirrigación 1 a 2 lt/ha. Foliar	A partir de los 15 días principalmente al iniciar la fructificación.
Papas	2 a 3 lt/ha. Fertirrigación 1 a 2 lt/ha. Foliar	A partir de los 15 días principalmente al iniciar la fructificación.
Calabazas, Melones, Sandías, Pepinos	2 a 3 lt/ha. Fertirrigación 1 a 2 lt/ha. Foliar	
Lechuga, Brócoli, Repollo	2 a 3 lt/ha. Fertirrigación 1 a 2 lt/ha. Foliar	Al inicio de fructificación.
Maíz, Maíz Dulce, Trigo, Sorgo Avena, Cebada	1 a 2 lt/ha. Foliar	Al cierre de cultivo.
Frijol, Frijol Ejotero, Soya Chicharo, Garbanzo	1 a 2 lt/ha. Foliar	Al aparecer primeras vainas.
Frutales	2 a 3 lt/ha	En etapa de fructificación y en la inducción de floración.

BOROFIX ® FICHA TÉCNICA

Corrector de deficiencia.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Borofix®

No es flamable ni volátil. Tampoco es cáustico ni venenoso, pero como se aplica en conjunto con plaguicidas, debe manejarse con las mismas precauciones que cualquier agroquímico.

Evítese la contaminación de mantos acuíferos, corrientes y depósitos de agua.

Maneje el envase vacío, de acuerdo a la normatividad establecida.

Durante la aplicación se deberán utilizar guantes, mascarilla, lentes, overol y botas de hule.

No fumar, comer o beber durante la aplicación.

En caso de contacto directo con la piel o los ojos, lávese bien y enjuáguese con abundante agua.

Después de un día de trabajo, báñese perfectamente y póngase ropa limpia.

En caso de ingestión, el médico puede proporcionar tratamiento sintomático.

Borofix®

No debe ser almacenado por periodos largos en recipientes diferentes al original y nunca deben usarse recipientes oxidados para su almacenamiento.

En caso de ingestión aplicar tratamiento sintomático, no se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

LIGERAMENTE TÓXICO

GARANTÍA:

Debido a que el uso de este producto está fuera de nuestro control, no damos garantía expresa ni implícita sobre efectos o resultados inherentes a su uso, tanto si se emplea o no de acuerdo a las instrucciones. El comprador acepta todos los riesgos del uso y manejo del material, esté o no de acuerdo con las recomendaciones o sugerencias del fabricante. Ni el fabricante ni el vendedor aceptan reclamaciones ni ofrecen garantías explícitas o implícitas.